

## **Kindheit**

Engstand und Verschachtelung der Zähne im Unter- und Oberkiefer.  
Lose Spange für den Oberkiefer zur Weitung des Gaumens.

## **Junge Erwachsene**

Oberkiefer: Spalt in Schneidezähne gesägt.

## **Vor ca. 32 Jahren kieferorthopädische Behandlung**

### **Oberkiefer**

Entfernung zweiter Zahn hinter dem Eckzahn, rechte Seite  
Entfernung beider Weisheitszähne.

Im Anschluss der Behandlung Einschleifen der Zähne.

## **Beschwerden, die nach und nach auftraten**

Stiche hinter den Augen, Doppelsehen (Verordnung Brille), Augenflimmern (Blitze),  
Lidrandzucken.

Starke Berührungsempfindlichkeit der Kopfhaut.

Druckgefühl am Kopf hinter dem rechten Ohr.

Hin und wieder beim Einschlafen Pulsgeräusche rechts. Unerträgliches Ohrenjucken rechts.  
Nach Flug, starkes Druck-/Wattegefühl, Schwerhörigkeit und Stiche im rechten Ohr (Nachlassen nach  
ca. drei Tagen).

Einseitiger Gesichtsschmerz rechts.

Unerklärliche Zahnschmerzen.

Kiefergelenkknacken beim Kauen rechts.  
Reibegeräusche Kiefergelenke beidseitig.

Kloß im Hals.

Beim Kauen häufiges in die Wange beißen, links.

Hüftschmerz links.

### **September 2011**

Beim Kauen, Spaltung des zweiten Zahns hinter dem linken Eckzahn im OK.  
Extraktion des Zahns.

Mein Zahnarzt riet mir, die entstandene Lücke durch eine kieferorthopädische Behandlung schließen zu lassen (meine Vorstellung war ein Implantat).

### **Kieferorthopädische Behandlung Ober- und Unterkiefer ab März 2012**

#### **Beschwerden während der Behandlung:**

Pulsschlag in beiden Ohren über Monate zu hören (verstärkt im rechten Ohr)

Ohrenschmerzen, rechts

Schwerhörigkeit, rechts

Ohren- und Nasennebenhöhlenentzündung, rechts

Nasennatmung rechts nicht möglich

Lispeln

Augennendruck grenzwertig (2014).

Bei Anstrengung Anschwellen der Arterie an der linken Schläfe.

Gefühl, als wenn der Kopf platzt. Schmerz auf einer Skala von 0 – 10: 10.

Innere Unruhe.

### **Anfang 2016**

Entfernung Brackets

### **Februar 2016**

Weiche Gummischienen für OK und UK, fester Retainer im UK.

### **August 2016**

Feste Schiene für den OK.

### **Dezember 2016**

UK, zusätzlich loser Retainer.

**März 2017**

Geweberiss (Delle) im rechten OK (Schmerzen, als wenn mit einem spitzen Messer hineingestochen wurde). Unmittelbar danach, Speichelfluss, Ohrenknacken rechts, Lippenbeben und das Gefühl, die Nase hebt sich.

**Juni 2017**

OK links, beim Kauen Absplitterung am Höcker des ersten Zahnes hinter dem Eckzahn.

**September/Oktober 2017**

Wochenlang Druck auf dem rechten Ohr und ausgeprägte Schwerhörigkeit. Schmerzen im rechten Kiefer und der rechten Zungenseite. Ich hatte das Gefühl, der Kiefer drückt in den Gehörgang oder sitzt da fest. 12 Schmerztabletten, verteilt über Tag und Nacht.  
Am anderen Tag flossen große Mengen blutiges Sekret aus dem Ohr.

Behandlung HNO: Absaugen des Sekrets, ofloxacinhaltige Ohrentropfen, Nasenspray.

Beginnende Hochtonschwerhörigkeit.

Bis heute setzt sich das rechte Nasenloch zu.  
Ohrengeräusche im rechten Ohr, verstärkt abends.

Wandernde Beschwerden in den Kiefern.

Zahn- und Kieferbeschwerden.

Beschwerden im Bereich des rechten Jochbogens und des rechten Auges.

Zeitweise geringer Schwindel und Gangunsicherheit.

Vermehrt Blähungen

Kloßgefühl im Hals

Knacken im Halswirbelbereich hat nach Weglassen der Schiene etwas nachgelassen.

Hüftschmerz links.